

วิธีให้ Antivenom Neurotoxin Snake

1. ไม่ต้องทำ skin test ก่อนให้

2. ครั้งแรกผสม 2 vial ผสม NSS up to 50 ml (เด็กผสม 10-20 ml) iv drip in 15 min

* ห้ามเขย่าแรงเวลาผสม เนื่องจากจะทำให้ protein aggregate แล้วแพ้ได้

3. observe อาการแพ้ขณะให้ยา เช่น ผื่นคัน แน่นหน้าอก หน้า/ปากบวม ปวดท้องคลื่นไส้ อาเจียน , BP drop ถ้ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้หยุด Antivenom รักษาอาการแพ้ด้วย

Antihistamine และ Steroid เช่น CPM, Dexamethasone ถ้าแพ้รุนแรงเช่น BP drop, Angioedema ให้ Adrenaline 0.5 ml IM ร่วมด้วย

* ถ้าเกิดอาการแพ้ Antivenom กรุณาแจ้งศูนย์พิษวิทยา รพ.รามาธิบดี โทร.1367

4. ถ้า dose แรก ไม่แพ้ ต่อไปให้ Antivenom 2 vial, 3 vial และ 3 vial ตามลำดับ (รวม 10 vial) โดยผสม NSS up to 50 ml (เด็กผสม 10-20 ml) iv drip ชะลอละ 15 นาที (รวม 1 ชม.), observe อาการแพ้เช่นเดิม

5. จด lot , number ของ antivenom ด้วย